

Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(5. Fortsetzung.)

Lobesia Gn.

Permixtana Hb. — 6, auf den Berglehnen bei Mödling, am Eichkogel und bei Baden auf Sträuchern, selten.

Cymolomia Led.

Hartigiana Rtz. — 6, Mauer im Gemeinewald. Raupe auf *Abies excelsa* DC.

Eccopsis Z.

Latifasciana Hw. — 6, 7, Mauer im Gemeinewald und auf dem Gahns in jungen Gebüschern, selten.

Petalea Gn.

Festivana Hb. — 6, bei Gumpoldskirchen aus Eichengebüsch gescheucht, sehr selten. (Raupe in Toscana auf *Quercus*.)

Grapholitha Tr.

Grandaevana Z. — 7, bei Neustein-
hof am Liesingbache. Raupe in zusammengerollten Blättern von *Tussilago* und *Petasites*, selten.

Infidana Hb. — 6, auf der ehemaligen Türkenschanze auf Hutweiden und Berglehnen, auch nächst der steiermärkischen Grenze, selten.

Agrestana Tr. — 6, in den Vierziger-Jahren mehrere Male am Rande des Liechtensteinparkes und in Mödling gefangen. Raupe auf *Parietaria*?

Lacteana Tr. — 7, bei Tivoli auf *Artemisia*.

Albidulana HS. — 7, Tivoli in den Remisen, auf *Artemisia*. Raupe in den Stengeln von *Artemisia*, an welchen sie Beulen erzeugt.

Hornigiana Led. — 6, 7, auf den Berglehnen bei Mödling, am Liechtenstein und bei Gumpoldskirchen. Raupe nach Freund Hornig unverwandelt

überwinternd in den Blütenköpfen von *Inula Oculus Christi*.

Fervidana Z. Is. 1847. — 6, auf der Himmelswiese ober Kalksburg, bei Rodaun und am Gaisberg, selten.

Expallidana Hw. — 5, auf der Himmelswiese bei Kalksburg und am Eichkogel, selten.

Hohenwartiana Tr. — 5, 7, 8, überall in der Wiener Gegend um *Carduus*, *Verbascum*, *Hypericum* etc. Raupe an *Hypericum* und *Artemisia*.

var. Jaceana HS. — Wie die Stammart.

Aemulana Schl. — 7, Bisamberg auf gras- und pflanzenreichen Plätzen.

Caecimaculana Hb. — 6, 7, Rodaun am Bache, auf Hutweiden und Berglehnen, nicht häufig. Raupe an *Verbascum*.

Modicana Z. Is. — 5, 6, Liechtenstein, Mödling auf trockenen Lehnen und Bergen bis Vöslau. Raupe auf *Inula Oculus Christi*.

Hepaticana Tr. — 6, 7, auf den Schneeberger Alpen, am Gahns, Lakerboden, Alpeleck etc.

Confusana HS. — 7, im Prater auf *Senecio*. Selten. Raupe in Stengeln von *Senecio Jacobaea*.

Hepatariana HS. — 6, am Liechtenstein aus Hecken gescheucht, in Mauer bei der Schiessstätte, sehr selten.

Ravulana HS. — 6, im Prater einige am Schüttel-Zaun gefangen, sehr selten.

Graphana Tr. — 6, Rodaun, Gaisberg, Gieshübel etc. auf Berglehnen, nicht häufig.

Kochiana HS. 236. — 6, 7, auf dem Eichkogel und in Gumpoldskirchen, selten.

Nigricana HS. — 5, 6, Mauer auf Tannen, selten. Raupe in Knospen von *Abies pectinata* DC.

Rhododendrana HS. — 7, Schneeberg, Saugraben um *Rhododendron*, Gahns auf *Vaccinium*, selten. Raupe an *Rhododendron hirsutum*.

Tedella Cl. (Comitana Schiff.) — 6, überall auf Fichten und Tannen, häufig. Raupe minirt die Nadeln von *Abies excelsa*, welche im Vereine mit dem ausgeworfenen Koth durch Gespinnstfäden verbunden werden.

Proximana HS. — 6, Pressbaum, Mauer im Gemeindewald auf Tannen, selten. Raupe an Tannen- und Fichtennadeln.

Demarniana F. R. — 7, auf den Berglehnen zwischen Gumpoldskirchen und Baden, selten.

Subocellana Don. — 7, auf *Salix Caprea* im Prater, in Mauer etc., auch auf den Alpen des Schneeberges.

Nisella Cl. — 7, 8, überall auf Pappel- und Weidenstämmen, häufig. Raupe auf *Salix* und *Populus*, besonders *Populus alba*.

Ustulana Hb. — 5, 6, im Prater um Brombeeren. Raupe im Mai in zusammengespinnenen Blättern von *Rubus fruticosus*.

Penkleriana F. R. — 6, 7, überall in Erlen- und Birkengebüschen, nicht selten. Raupe in den Blüten von *Alnus*, *Corylus* und *Betula*.

Ophthalmicana Hb. — 9, in Erlen- und Buchengebüschen, selten. Raupe auf *Alnus*, *Fagus* und *Populus*.

Solandriana L. und sämtliche Varietäten. — 8, in jungen Gebüschchen, Bisamberg, Weidlingbach, Prater, selten. Raupe auf *Corylus*, *Betula* und *Alnus* in gerollten Blättern.

Semifuscana Stph. — 9, Mauer um *Quercus*, sehr selten.

Sordidana Hb. — 9, 10, in *Alnus*-Gebüschchen, im Prater, selten.

Bilunana Hw. — 6, 7, im Prater,

Tivoli um *Quercus*- und verschiedenes anderes Gebüsch.

Tetraquetrana Hw. — 4, 5, überall in Erlen- u. Birkengebüschchen, im Prater, nicht selten. Raupe auf *Alnus* und *Betula*.

Immundana F. R. — 5, Prater auf *Alnus*, Weidling-am-Bach auf *Betula*.

Estreyeriana Gn. — 6, auf dem Bisamberg 1842 einige Stücke gefangen.

Crenana Hb. — 6, im Prater und bei Kalksburg auf *Salix*, sehr selten.

Similana Hb. — 6, in den Laaer Remisen, in Mauer, Hütteldorf, im Prater, um Laubgebüschchen, selten.

Thapsiana Z. — 6, bei Tivoli, Kalksburg, am Eichkogel um junges Gesträuch. Raupe auf *Thapsia garganica* zwischen zusammengezogenen Blättern.

Incarnatana Hb. 191. — 7, 8, überall in Remisen und auf Berglehnen um Rosen, Weissdornhecken. Raupe auf *Crataegus* und *Populus tremula*.

Suffusana Z. — 6, 7, überall auf Berglehnen und in Remisen auf Weissdorn und Rosen. Raupe auf *Prunus spinosa*, *Crataegus* und *Populus tremula*.

Tripunctana F. — 5, 6, überall um Dornhecken, nicht selten. Raupe auf *Prun. spin.*, *Rosa*, *Crataegus* und *Pyrus*.

Cynosbana F. — 6, 7, bei Dornhecken überall in Oesterreich. Raupe auf *Pop. trem.*, *Crataegus* und *Prun. spin.*

Asseclana Hb. — 5, 6, Remisen bei Tivoli, in Mauer, Rodaun bis Baden auf Berglehnen in Gebüschchen. Raupe an *Aster*.

Mendiculana Tr. — 6, Mauer, Mödling bei der breiten Föhre, Eichkogel, selten. Raupe auf *Erica*.

Pflugiana Hw. — 5, 7, auf Hutweiden, Brachfeldern und an Waldrändern, wo Disteln sind. Raupe im Stengel von *Carduus*.

Cirsiana Z. — 6, 7, auf den Schneeberger Alpen, Gahns, Alpeleck, Heuplake, selten.

Trigeminana Stph. — 7, auf dem Gahns, der Bodenwiese, selten.

Obscurana HS. — 5, 6, Mödling auf Berglehnen, auch am Rodauner Gaisberg.

Tetragonana Stph. — 7, Gahns, Boden- und Brandstattwiese, sehr selten. Raupe auf *Tussilago* und *Valeriana*.

Sublimana HS. — 7, Heuplacke am Schneeberg und dem Ochsenboden, selten. Raupe auf *Tussilago* und *Calluna*.

Brunnichiana Froel. — 5, 6, auf sumpfigen Berglehnen und an Bachrändern.

Turbidana Tr. — 6, bei Neustenhof und der Springermühle an Bachrändern der Liesing, selten.

Foenella L. — 7, Praterauen, Laaerberger Remisen. Raupe in den Stengeln der *Artemisia vulgaris*.

Citrana Hb. 185. — 6, 7, überall auf Berglehnen um Wien. Raupe in den Blüten von *Achillaea* und *Artemisia*.

Pupillana Cl. — 7, Bisamberg, Brühl auf *Artemisia Absinthium*, selten.

Metzneriana Tr. Hb. 311. — 6, Mauer, Mödling und Gumpoldskirchen. Raupe auf *Artem. Absinthium*.

Wimmerana Tr. — 6, Bisamberg um Wermuth. Raupe an *Artemisia Absinthium*.

Conterminana HS. — 7, auf Berglehnen des Liechtenstein bei Mödling am Eichkogel etc., ziemlich selten.

Aspidiscana Hb. 256. — 6, 7, von Mauer bis Baden auf Berglehnen auf pflanzenreichen Stellen, Alpen. Raupe in den Herzblättern und Blüten von *Aster* und *Solidago*.

Catoptrana Mn. i. lit. — 6, auf dem Alpeleck auf Wollweiden gefangen, sehr selten. Raupe auf *Epilobium*.

Hypericana Hb. — 6, 7, überall in der Wienergegend und auf Alpen, gemein. Raupe an den Blättern und Blüten von *Hypericum*.

Albersana Hb. — 6, Gahns, Brandstattwiese und Lockerboden, hohe Wand, selten.

Incana Z. — 6, Brühl im Kienthal, selten. Raupe auf *Artemisia campestris*, in knotig aufgetriebenen Stengeln.

Tenebrosana Dup. — 7, in den Remisen bei Tivoli, Mauer.

Nebritana Tr. — 7, Mauer, Liechtenstein um Sträucher. Raupe in den Hülsen von *Colutea arborescens*.

Roseticolana Z. — 7, in den Remisen bei Tivoli und am Bisamberg. Raupe auf *Rosa* in den Hagebutten.

Lerneana Tr. — 6, Baden, Gumpoldskirchen auf pflanzenreichen Berglehnen, selten.

Zebeana Rtz. HS. 354. — 6, auf Lärchenbäumen auf dem Gahns einzeln angetroffen. Raupe in der Bastschichte von *Larix europaea*. Die Stellen, wo Raupen fressen, werden sehr stark aufgetrieben und findet daselbst ein bedeutender Harzausfluss statt.

Funebrana Tr. — 5 u. 7, in Obstgärten an Stämmen, Mauern und Zaunplanken sitzend. Raupe in Früchten von *Prunus domestica* und *spinosa*.

Gemmiferana Tr. — 6, Baden einzeln auf Berglehnen, selten.

Caecana Schl. — 5, Bisamberg, Eichkogel auf Hutweiden und Berglehnen. Auch im August vorkommend.

Succedana Froel. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen. Emmerberg. Ich habe die Raupe auf verschiedenen niederen Pflanzen, besonders auf *Thymus* mehrmals gefunden und gezogen.

Servillana Dup. — 6, 7, auf Weiden. Prater, Kalksburg, Brunn, selten. Raupe lebt in der Markröhre der Zweige verschiedener *Salix*-Arten und

verursacht dadurch eine längliche Anschwellung.

Strobilella L. — 5, 6, in Nadelholzwäldern auf Zweigen und an den Stämmen. Raupe in Zapfen von *Abies excelsa*.

Conicolana Heyl. — 5, Mauer. Die Raupe wurde vom Herrn Oberförster Wachtl in den Zapfen von *Pinus nigricans* gefunden und lebt von dem Samen.

Splendidulana Gn. — 6, im Prater an Zaunplanken, selten.

Corollana Hb. — 6, Mauer im Gemeindewald, bei Hetzendorf an Eichenstämmen, selten. Raupe in Knoten an Zweigen von *Pop. tremula*.

Scopariana HS. — 4, 5, im Laaerwäldchen, in Tivoli, bei Mauer, auf *Quercus* und *Calluna* vorkommend.

Cosmophorana Tr. — 5, 6, Tivoli, Mauer auf Eichen gefangen und von Kiefern abgeklopft. Raupe in Harzgallen der *Pinus sylvestris*.

Coniferana Ratz. — 5, 6, Mauer, Mödling auf Kiefern. Raupe in der Bastschicht von *Abies excelsa* und *Pinus sylvestris*.

Illutana HS. 130. — 6, bei Tivoli auf *Quercus*, selten.

Pactolana Z. — 5, Mauer im Gemeindewald auf Tannen. Raupe im Baste von *Abies excelsa*.

Woeberiana Schiff. — 5, 6, in Gärten auf Aprikosen und Pfämen. Raupe im Baste von *Armeniaca vulgaris* und *Prunus domestica*; verräth sich durch den Harzausfluss.

Rufillana Wik. — 5, im Prater am Schüttelzaun, in Rodaun auf *Dipsacus*-Blüthen, selten. Raupe in Samen von *Dipsacus sylvestris*.

Compositella F. — 4, 5 und 8, an Berglehnen auf Sträuchern, überall um Wien. Raupe auf niederen Pflanzen: *Onobrychis*, *Coronilla*.

Duplicana Zett. — 5, 6, Bisamberg auf *Juniperus* gefangen, in Mauer und am Liechtenstein auf Kiefern. Raupe im Baste von *Abies excelsa* und unter der dicken, schwammigen Rinde beulenförmiger Anschwellungen an *Juniperus communis*, welche durch einen Pilz, *Accidium elatinum* Alb. et Schw., verursacht werden. Von Herrn v. Hornig in Niederösterreich (von Herrn Oberförster Wachtl in Galizien) gesammelt.

Perlepidana Hw. — 5, in der Wiener Gegend auf *Prunus spinosa et domestica*, selten.

Pallifrontana Z. — 5, Laaerberg auf *Ulmus*, selten.

Fissana Fröl. — 5, 6, überall um Wien an Waldrändern auf Schlehen und anderen Laubholzhecken. Raupe auf *Abies excelsa* und *Pinus sylvestris* in der Rinde junger Zweige.

Discretana Wk. (Dorsana Hb. 36.) — 6, im Prater in Gebüsch um Hopfen. Raupe auf *Humulus Lupulus* und *Alnus*.

Inquinatana Hb. 43. (Jungiana Dup.) — 5, am Rande der Remisen des Laaerberges auf Ulmen gefangen. Jetzt ist dort keine mehr zu finden, da Ulmen daselbst nicht mehr existiren. Raupe auf *Ulmus*.

Leguminana Z. — 6, im Prater an Planken, in Mauer und am Laaerberge um Gebüsch. Raupe auf *Acer*, *Fagus* und *Quercus*.

Dorsana F. (Jungiana Fröl.) — 6, auf dem Rodauner Gaisberg und bei Perchtholdsdorf um junges Gebüsch.

Coronillana Z. — 6, auf den Berglehnen bei Mödling und am Eichkogel, selten.

Aurana F. — 6, im Prater, in Dornbach, Grinzing, an Waldrändern auf Doldenblüthen.

var. Aurantiana Klfr. Btr. II. 84. — Zugleich mit *Aurana* auf Dolden.

(Fortsetzung folgt.)